

PAKKAUSSELOSTE

Mobilat[®] emulsiovoide

Vaikuttavat aineet: lisämunuaisen kuorikerroksen uute
(kortikosteroideja 0,2 mg), mukopolysakkaridipolysulfaatti, salisyylihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Mobilat-emulsiovoidetta huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lieydy.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Mobilat on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Mobilat-emulsiovoidetta
3. Miten Mobilat-emulsiovoidetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Mobilat-emulsiovoiteen säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ MOBILAT ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Mobilat on kolmen lääkeaineen yhdistelmävalmiste.

Mobilat-emulsiovoiteen vaikuttavat aineet imeytyvät jonkin verran ihon läpi alla oleviin kudoksiin. Ne estävät tulehdusreaktioita ja edistävät turvotuksen häviämistä, jolloin kipu lievittyy.

Mobilat-emulsiovoidetta käytetään

- lihas- ja nivelsärlyn paikallishoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT MOBILAT-EMULSIOVOIDETTA

Älä käytä Mobilat-emulsiovoidetta

- jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttaville aineille tai jollekin muulle Mobilat-emulsiovoiteen aineosalle
- jos sinulla on vesirokko, rokotusreaktioita tai ihon sieni- ja bakteeri-infektioita.

Ole erityisen varovainen Mobilatin suhteen

- Hoidettaessa pitkiä aikoja suuria ihoalueita munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla tulee saavutettava hyöty haittoihin verrattuna harkita huolellisesti.

Emulsiovoiteen joutumista rikkoutuneelle iholle, avoimiin haavoihin, silmiin tai limakalvoille tulee välttää.

Ei alle 12-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.

Jos oire jatkuu Mobilat-hoidosta huolimatta, on syytä ottaa yhteyttä lääkäriin.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Mobilat sisältää salisyylihappoa, joka voi lisätä ihon läpäisevyyttä muille samaan kohtaan käytetyille lääkkeille.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Mobilat-emulsiovoidetta ei pidä käyttää suurilla ihoalueilla.

Mobilat-emulsiovoidetta ei pidä käyttää rintojen alueella.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ei tunnettuja vaikutuksia.

Tärkeää tietoa Mobilat-emulsiovoiteen sisältämistä aineista

Villarasva voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

3. MITEN MOBILAT-EMULSIOVOIDETTA KÄYTETÄÄN

Käytä Mobilatia juuri sen verran kuin tässä pakkausselosteessa esitetään. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Mobilat-emulsiovoidetta hierotaan kevyesti hoidettavalle ihoalueelle kerran tai useita kertoja päivässä, ellei lääkäri toisin määrää.

Ei alle 12-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä.

Käytettäessä sidosta tai tukisidosta annosta tulee suurentaa. Mobilat-emulsiovoide sopii hyvin käytettäväksi myös okklusiosidosten alla, katso alla oleva käyttöohje.

Okklusiosidoksen käyttöohje



Levitä emulsioidetta ranteeseen.



Sido ranne joustavalla kiinnityssiteellä edeten ensin kämmenen suuntaan. Kiedo side peukalon toiselta puolelta kämmenen yli ja leikkaa seuraavalla kierroksella siteeseen reikä peukaloa varten.

Kiedo ranteen ympärille muovista talouskelmua reilu kerros niin, että voide peittyi.



Kierrä sidettä ranteen yläpuolelle asti ja kiinnitä se. Vaihda sidos kahdesti päivässä, ellei lääkäri toisin määrää.

Jos käytät enemmän Mobilat-emulsioidetta kuin sinun pitäisi

Annostustavan vuoksi äkillisen yliannostuksen vaara on erittäin epätodennäköinen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Mobilatkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavaa luokitusta käytetään arvioitaessa haittavaikutusten yleisyyttä:

Harvinainen (esiintyy 1-10 käyttäjällä 10 000:sta):

Harvinaisissa tapauksissa voi esiintyä paikallista ihoärsytystä.

Hyvin harvinainen (esiintyy harvemmin kuin yhdellä 10 000:sta käyttäjästä):

Yksittäisissä tapauksissa voi esiintyä kosketusallergiaa.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. MOBILAT-EMULSIOVOITEEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Mobilat-emulsioidetta pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytetään huoneenlämmössä (15 – 25 °C).

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Mobilat sisältää

Vaikuttavat aineet ovat lisämunuaisen kuorikerroksen uute (kortikosteroideja 0,2 mg), mukopolysakkaridipolysulfaatti, salisyylihappo.

1 g emulsioidetta sisältää lisämunuaisen kuorikerroksen uutetta 10,0 mg (kortikosteroideja 0,2 mg), mukopolysakkaridipolysulfaattia 2,0 mg, salisyylihappoa 20,0 mg.

Muut aineet ovat:

Glyseroli 85%, Herba Natura tuoksuöljy, steariinihappo, emulgoituva setostearyylialkoholi (tyyppi A), myristyylialkoholi, Eucerin (villavaha-alkoholi voide), etanoliamiini, natriumedetaatti, isopropanoli ja puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, homogeeninen voide, jolla on sille ominainen tuoksu.

Pakkauskoot: 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ja 125 g.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Saksa.

Valmistajat

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Saksa.

ja

Mobilat Produktions GmbH

Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Saksa

Lisätietoja antaa

Oy STADA Pharma Ab

00100 Helsinki, Suomi.

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

8.12.2009