

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Mobilat[®] gel

Aktiva substanser: binjurebarkextrakt (kortikosteroider 0,2 mg), mukopolysackarid polysulfat, salicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Mobilat måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Mobilat är och vad det används för
2. Innan du använder Mobilat
3. Hur du använder Mobilat
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mobilat ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD MOBILAT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Mobilat gel är ett kombinationspreparat som innehåller tre läkemedel.

Mobilat gelets verksamma ämnen tränger i någon mån genom huden till underliggande vävnader. De motverkar inflammationsreaktioner och befrämjar minskning av svullnad varvid smärtan lindras. Mobilat gelet har en angenäm svalkande verkan.

Mobilat gel används för

- lokalbehandling av muskel- och ledvärk.

2. INNAN DU ANVÄNDER MOBILAT

Använd inte Mobilat gel

- om du är allergisk (överkänslig) mot aktiva substanser eller mot något av övriga innehållsämnen i Mobilat gel
- om du har vattkoppor, vaccinationsreaktion, svamp- eller bakterieinfektioner på huden.

Var särskilt försiktig med Mobilat gel

- Vid långvarig behandling av stora hudområden hos patienter som lider av njursvikt, bör man noggrant överväga fördelarna av behandlingen mot nackdelarna.

I gelet ingår alkohol (isopropanol), varför man bör undvika att få gelet på sårig hud, på öppna sår, i ögon eller på slemhinnor, där den förorsakar sveda.

Ej för barn under 12 år utan läkarordination.

Om symtomet fortgår trots behandlingen med Mobilat bör man kontakta läkare.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Mobilat innehåller salicylsyra som kan öka hudens permeabilitet för andra läkemedel som används på samma hudområde.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Under graviditeten bör Mobilat inte användas på stora hudområden.

Mobilat bör inte användas på området kring och på bröstet.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan.

Viktig information om något innehållsämne i Mobilat gel

Propylenglykol: kan orsaka hudirritation.

3. HUR DU ANVÄNDER MOBILAT

Använd Mobilat enligt anvisningar som ges i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Mobilat-gelet stryks ut på det sjuka området flere gånger om dagen, om inte läkaren föreskriver annat.

Användning av gelet under ocklusionsband bör undvikas.

Ej för barn under 12 år utan läkarordination.

Om du har använt för stor mängd av Mobilat

Tack vare doseringssättet är risken för en akut överdosering mycket osannolik.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Mobilat orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande klassificering används vid värdering av biverkningarnas frekvens:

Sällsynt (förekommer hos 1-10 av 10 000):

I sällsynta fall kan lokal irritation av huden förekomma.

Mycket sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 10 000)

I enstaka fall kan kontaktallergi förekomma.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR MOBILAT SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i rumstemperatur (15 – 25 °C).

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är binjurebarkextrakt (kortikosteroider 0,2 mg), mukopolysackarid polysulfat, salicylsyra.

1 g gel innehåller binjurebarkextrakt 10,0 mg (kortikosteroider 0,2 mg), mukopolysackarid polysulfat 2,0 mg, salicylsyra 20,0 mg.

Övriga innehållsämnen är:

Isopropylalkohol, karbomer, etanolamin, natriumedetat, propylenglykol, rosmarinolja, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Genomskinlig, opalskimrande, färglös eller något brunaktigt gel med doft av 2-propanol och rosmarinolja, utan synliga anhopningar eller partiklar.

Förpackningsstorlekar: 30 g, 40 g, 50 g och 100 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Tyskland

Tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel, Tyskland

och

Mobilat Produktions GmbH
Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen, Tyskland

Information lämnas av

Oy STADA Pharma Ab, 00100 Helsingfors, Finland

Denna bipacksedel godkändes senast

8.12.2009